

La cigarette électronique chez les adultes en France: prévalence et déterminants de l'usage chez les adultes. Résultats de l'étude représentative DePICT

Fabienne El-Khoury Lesueur¹; Camille Bolze¹; Maria Melchior¹

¹ INSERM, Sorbonne Université, Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique IPLESP, Équipe de recherche en épidémiologie sociale, F75012 Paris, France Contact : etude.depict@iplesp.upmc.fr

Introduction

Il existe un débat sur le rôle de la cigarette électronique dans les stratégies de lutte contre le tabagisme. Par conséquent, un suivi continu de la prévalence et des déterminants de l'usage la cigarette électronique est nécessaire.


Méthodes

Nous décrivons la prévalence de l'expérimentation et de l'usage actuel de la cigarette électronique, à partir des données de l'enquête téléphonique DePICT (Description des Perceptions, Images et Comportements liés au Tabagisme), qui a recruté en 2016 un échantillon de 4354 participants, représentatifs des adultes âgés de 18 à 64 ans, résidant en France métropolitaine. Les variables associées à l'usage de la cigarette électronique ont été déterminées par régression logistique multivariée à partir de données pondérées.


Résultats

Environ un tiers (29%) des adultes en France âgés de 18 à 64 ans avaient essayé la cigarette électronique et environ 4% étaient utilisateurs réguliers. Les variables associées à l'usage régulier incluent: fumer des cigarettes, consommer du cannabis, le sexe masculin, et déclarer être en mauvaise santé.

Parmi les vapoteurs qui fument, 72% déclarent diminuer le nombre de cigarettes fumées en vapotant.



Graphique 1 : Expérimentation de la cigarette électronique selon le sexe



Graphique 2 : usage actuel de la cigarette électronique selon le sexe

Conclusion

La prévalence de la consommation actuelle de cigarettes électroniques chez les adultes en France est plutôt faible. L'usage régulier des cigarettes électroniques est principalement observé chez les fumeurs, probablement dans une optique de réduction du nombre de cigarettes fumées.