

Traitements agonistes opioïdes (TAO) en milieu carcéral et articulation avec les CSAPA

Claire Joubert, Thierry Danel

Introduction : On estime que 9,2 % des personnes arrivant en détention dans le Nord-Pas-de-Calais présentent une dépendance à l'héroïne, soit 47 fois plus qu'en population générale (0,2 %). Les personnes sortant de prison ont un risque augmenté de décès par surdose, particulièrement dans les deux premières semaines suivant la sortie. Actuellement, 8 % des personnes détenues en France bénéficient d'un traitement par TAO contre seulement 2 % en 1998.

Objectif : L'objectif principal de cette étude est de faire un **état des lieux des pratiques de prescription des TAO en milieu carcéral** dans les Hauts-de-France en insistant sur le relais avec les CSAPA.

Méthode : Il s'agit d'une étude descriptive observationnelle transversale. Des auto-questionnaires anonymes ont été adressés aux 93 médecins exerçant en milieu carcéral et aux 54 médecins responsables des TAO dans les CSAPA de la région entre décembre 2019 et février 2020.

Résultats : 38 médecins exerçant en milieu carcéral (41%) et 23 médecins exerçant en CSAPA (43%) ont participé à l'étude. Parmi les médecins exerçant en milieu carcéral, 84 % n'ont **pas de formation spécifique en addictologie** et 42 % déclarent qu'il n'existe **pas de protocole** relatif à l'instauration des TAO dans leur établissement. 65 % répondent qu'ils seraient intéressés par des **outils d'aide à la prescription**. 57 % des répondant.e.s exerçant en CSAPA déclarent qu'il y a **peu ou pas de contacts avec le service intervenant en addictologie en milieu carcéral**.

Conclusion : Les pratiques en matière de prescription des TAO sont **hétérogènes** et l'articulation entre milieu ouvert et milieu carcéral complexe. Des actions visant à **favoriser les échanges et la formation** entre professionnels du milieu carcéral et du milieu ouvert pourraient être proposées.




Figure 1 - Répartition des médecins exerçant en milieu carcéral dans les Hauts-de-France selon la fréquence de prescription des TAO, N=38




Figure 2 - Répartition des médecins exerçant en milieu carcéral dans les Hauts-de-France selon la prise en charge proposée dans une situation de renouvellement de traitement par buprénorphine haut dosage interrompu depuis moins de 3 jours, N=38




Figure 3 - Pourcentage de médecins exerçant en milieu carcéral et en CSAPA dans les Hauts-de-France qui déclarent qu'un contact est généralement pris à l'arrivée, pendant et avant la sortie de détention, N=61

Un guide de maniement des TAO en milieu pénitentiaire est disponible en ligne :

